

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ NARCAN®

02.2023

NARCAN®, или налоксон, — это жизненно важный препарат для лечения передозировки опиоидами (или отравления наркотическими веществами).

Поскольку препарат является антагонистом опиоидных рецепторов, он на некоторое время блокирует активность опиоидных рецепторов в мозге. После прекращения поступления опиоидов в мозг человек снова сможет дышать.

Если у человека НЕТ передозировки опиоидами, ему нельзя навредить с помощью препарата NARCAN®. Любой человек может иметь при себе препарат NARCAN®, ввести его лицу с передозировкой и тем самым, возможно, спасти ему жизнь.



ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ПРЕПАРАТ NARCAN®

Препарат можно получить в следующих общественных организациях:

➔ NARCAN® можно купить у фармацевта без рецепта. Вы также можете получить рецепт у своего врача, а стоимость препарата покроеет медицинская страховка.

➔ Посетите центры снижения вреда: Службы снижения вреда (Harm Reduction Services) и SANE: Безопасные альтернативы с помощью объединения и образования (Safer Alternatives Thru Networking and Education).

➔ Организации могут подать заявку на участие в проекте по выдаче налоксона через сайт DHCS.ca.gov для получения бесплатного препарата NARCAN® в больших количествах.

➔ Вбейте в строку поиска:

Программы обмена шприцев штата Калифорния (California Syringe Services Programs)

SacOpioidCoalition.org

РАСПОЗНАТЬ И ОТРЕАГИРОВАТЬ БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЙ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

1

Обратите внимание на симптомы

- Дыхание поверхностное, булькающее или остановка дыхания. Суженные зрачки.
- Кожа, губы и ногти имеют синюшно-серый оттенок. Кожа холодная и бледная.

2

Проверьте реакции

- С усилием помассируйте костяшками пальцев грудину, громко позовите человека по имени; если он не реагирует, переходите к следующим действиям.

3

Позвоните 911 и введите NARCAN®

- Вставьте флакон в ноздрю примерно на 1 дюйм и нажмите на поршень, чтобы распылить все содержимое.
- Если через 2–3 минуты реакции не будет, введите препарат во вторую ноздрю.

4

Выполните искусственное дыхание

- Выполняйте инструкции диспетчера 911 и продолжайте делать искусственное дыхание и/или непрямой массаж сердца до тех пор, пока человек не придет в себя или до прибытия скорой медицинской помощи.
- Делайте искусственное дыхание с частотой 1 вдох каждые 5 секунд.
- Если человек пришел в себя, скажите ему, что помощь уже в пути, и дождитесь приезда скорой медицинской помощи.
- Если дыхание возобновилось, переведите человек в устойчивое боковое положение и наблюдайте за его состоянием.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПИоиДАХ

К опиоидам относятся рецептурные препараты, используемые для лечения боли, такие как фентанил, а также запрещенные наркотики, такие как героин и другие синтетические аналоги опиоидов.

ИНФОРМАЦИЯ О ФЕНТАНИЛЕ

Фентанил — это сильнодействующий синтетический опиоид, который в **50–100 раз сильнее** морфина. Из-за высокой активности фентанила возрастает риск передозировки. Без рецепта фентанил продается в виде поддельных спрессованных таблеток, на которых может быть написано Adderall®, Norco®, Percocet®, Oxycotin® или Xanax®. Многие «клубные» наркотики, такие как экстази и кокаин, также могут быть смертельно опасными.

ДАЖЕ 1 ТАБЛЕТКА МОЖЕТ УБИТЬ

В США каждый день более 300 человек умирают от случайной передозировки опиоидами, и более 70 % этих смертей вызваны фентанилом.

*Центр по контролю и профилактике заболеваний



Фентанил вызывает сильнейшее привыкание, а смертельной дозой является всего 2 мг.



98 % протестированных наиболее распространенных наркотиков являются поддельными*

98 % протестированных таблеток содержат смертельную дозу фентанила*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ И
РЕСУРСЫ



SacOpioidCoalition.org/naloxone-distribution/

02.2023

ЗАКОН ДОБРОГО САМАРИТАНИНА ШТАТА КАЛИФОРНИЯ



AB472 защищает тех, кто пытается спасти жизнь жертве передозировки (отравления наркотиками).

Всегда звоните 911, потому что действие препарата Narcan длится от 30 до 90 минут, и вас не будут преследовать за оказание помощи на месте предполагаемой передозировки наркотиков.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ НА ФЕНТАНИЛ

Если вы планируете принимать наркотические средства, тест-полоски на фентанил являются одним из наиболее эффективных способов снижения риска при аккуратном и правильном использовании.



Тест-полоски не являются точными на 100 %!

Не всегда фентанил одинаково распределен по всей таблетке. Тест-полоска может показать отрицательный результат, если фентанил находится в другой части таблетки.

Наилучший метод — тщательно смешать и проверить все, что вы собираетесь употребить.

СОВЕТЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДА:

- **Никогда не принимайте наркотические средства в одиночестве.**
- **Всегда начинайте с малых доз.**
- **Проверяйте все, что собираетесь употребить, с помощью тест-полосок на фентанил и наборов реагентов.**
- **Всегда носите с собой NARCAN® и сообщайте друзьям, где он находится.**
- **После перерыва в употреблении наркотических средств риск передозировки выше.**
- **Snapchat/Instagram являются НЕБЕЗОПАСНЫМИ местами для приобретения наркотических средств. Не принимайте препарат, если вы НЕ УВЕРЕНЫ в том, что он куплен в аптеке или получен у врача.**

*При поддержке Калифорнийской сети профилактики передозировок, проект Центра лидерства и влияния в здравоохранении Института общественного здравоохранения. Высказанные здесь мнения не обязательно совпадают с мнением Института общественного здравоохранения.